



Entidades Clínicas donde se aplica:



1

1 DIRECTAMENTE SOBRE EL DIENTE:

Hipoplasias de esmalte, caries de mancha, prevención de caries dental, caries profunda con exposición pulpar, hipersensibilidad dentinal, reabsorciones radiculares, procesos periapicales, periodontitis apical.



2

2 LESIONES INFLAMATORIAS EN MUCOSA BUCAL:

Traumas en la mucosa, estomatitis aftosa, herpes labial, estomatitis subprotésica, gingivitis, gingivitis ulceronecrotizante, papilomatosis, periodontitis juvenil, queilitis angular, glositis, mucositis.



5

3 DOLOR TEMPOROTOMANDIBULAR, TRISMO MUSCULAR, ALGIAS FACIALES, PARESTESIAS Y PÁRALISIS FACIAL.

4 COMO APOYO AL TRATAMIENTO DE ENDODONCIA.

5 COMO APOYO AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MAXILOFACIAL:

Cirugía periodontal, Trasplantes de dientes retenidos, Heridas faciales, Cirugía para implantes, consecuencias de los implantes, traumas.



6

6 COMO APOYO AL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO:

Dolor al movimiento dentario, molestias durante el brote dentario, lesiones inflamatorias de mucosa, hipersensibilidad dentinal, reabsorciones radiculares, gingivitis, como apoyo a la cirugía de dientes retenidos, distracción osteogénica, microimplantes y otros.

En la contención ortodoncia. Hipersensibilidad post-retirada de brackets.